

Escala de suspeita de crises funcionais (SS-PNES)^a

Para cada item, selecione a alternativa que melhor corresponde à situação do paciente

	0 (zero)	1 (um)	2 (dois)	3 (três)
1- Principal tipo de crise nos últimos 3 meses	Desconexão pura, duração curta (< 30 segundos)	Estado de vigilância alterado com automatismos e/ou sinais motores unilaterais	Movimentos motores repetitivos, afetando os dois lados do corpo	Irresponsividade prolongada
2- Frequência das crises	Raras ou ocasionais	Mensalmente	Semanalmente	Diariamente
3- Duração do principal tipo de crise	< 1 minuto	Entre 1 a 2 minutos	Entre 3 a 5 minutos	> 5 minutos
4- Duração da doença, em anos	> 20 anos	Entre 11 a 20 anos	Entre 5 a 10 anos	< 5 anos
5- Frequência semanal de crises generalizadas, sob uso de medicamentos anticrises	Nenhuma	Uma ou duas	Três ou quatro	Cinco ou mais
6- Presença de lesões (ferimentos, machucados) em decorrência das crises	> 5 ocasiões	3 ou 4 ocasiões	1 ou 2 ocasiões	Nunca ocorreu
7- Idas à emergência por causa das crises	Nunca ocorreu	1 ou 2 ocasiões	3 ou 4 ocasiões	> 5 ocasiões
8- Primeira crise está claramente relacionada a um episódio de estresse emocional	Não	Improvável que esteja relacionada	Provavelmente relacionada	Claramente relacionada
9- Presença de outros sintomas físicos	Nenhum	1 (um)	2 (dois)	3 (três) ou mais
10- Tratamento psiquiátrico ou psicológico. Se sim, qual diagnóstico:	Nunca	Sim, só no passado	Sim, atualmente <u>sem</u> uso de medicamento psicotrópico	Sim, atualmente <u>com</u> uso de medicamento psicotrópico
11- Número de medicamentos psicotrópicos em uso (sem contar os medicamentos anticrises)	Nenhum	1 (um)	2 (dois)	3 (três) ou mais
12- História familiar de transtorno psiquiátrico. Descreva: _____	Nenhuma	Incerta	Sim, mas não o cuidador principal	Sim, o cuidador principal
13- Separação dos pais (abandono, morte, divórcio, e outras situações de conflito)	Nunca ocorreu	Só uma vez, por um período curto	Múltiplos episódios	Por um longo período ou distanciamento
14- História de negligência emocional durante a infância e adolescência	Nenhuma	Só uma vez	Mais de uma vez, mas raramente	Recorrente
15- Dificuldades de relacionamento com o cuidador principal	Nunca	Raramente	Ocasionalmente	Frequentemente

*Escore total \geq 20 pontos é indicativo de crises funcionais

*Escore total

^aTradução simples. Para um ponto de corte de 20 (de 45) pontos, a área sob a curva foi de 0,92 (IC 95%: 0,87–0,96), com acurácia de 87%, sensibilidade de 89%, especificidade de 85%, valor preditivo positivo de 77% e valor preditivo negativo de 94% (IC 95%) para diagnóstico de CNEPs. Uma pontuação abaixo de 20 pontos, indicativa de crise epiléptica, diminui a probabilidade de CNEPs em 94% dos pacientes, mesmo naqueles com o duplo diagnóstico. Fonte: <https://doi.org/10.1016/j.seizure.2021.04.025>.